

Tarmsmittor – handläggning enligt smittskyddslagen

Tarmsmitta	Kontrollprov	Riskyrke* Sjukskrivning	Förskolebarn Avstängning	Anmälningsskyldig	Smittspårningsskyldig	Inkubationstid
<u>Amöbainfektion (Entamoeba histolytica)</u>	Ja, minst 1 neg, >1 v. efter avslutad behandling	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	Dagar upp till månader, vanligen 2–4 veckor
<u>Calicivirus</u>	Nej	Efter 48 timmars symtomfrihet	Efter 48 timmars symtomfrihet	Nej	Nej	12–48 timmar
<u>Campylobacter</u>	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	2-5 (1-10) dagar
<u>Clostridioides difficile</u>	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Nej	Nej	---
<u>Cryptosporidium</u>	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	2-7 (2-14) dagar
<u>EHEC</u>	Ja, minst 1 neg, vid riskyrke eller förskolebarn med <i>stx2</i> -pos EHEC eller <i>stx1</i> - pos EHEC kopplat till HUS	Åter vid 1 neg prov vid <i>stx2</i> -pos EHEC eller <i>stx1</i> - pos EHEC kopplat till HUS	Åter vid 1 neg prov vid <i>stx2</i> -pos EHEC eller <i>stx1</i> - pos EHEC kopplat till HUS	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	2–4 (1-8) dagar

Tarmsmitta	Kontrollprov	Riskyrke* Sjukskrivning	Förskolebarn Avstängning	Anmälningsskyldig	Smittspårningsskyldig	Inkubationstid
<u>Giardia</u>	Ja, förskolebarn. 3 v. efter avslutad behandling	Åter efter behandling och vid symtomfrihet	Åter efter behandling och vid symtomfrihet	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	1–2 veckor
<u>Salmonella</u>	Ja, vid riskyrke. Om antibiotikabehandling >1 v. efter sista dos, annars >1–2 v. efter symtomfrihet	Omplacering om möjligt. Åter efter 1 neg prov	Åter vid symtomfrihet	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	12-48 (6-72) timmar
<u>Shigella</u>	Ja, vid riskyrke eller förskolebarn. Om adekvat antibiotikabehandling minst ett neg >1 v. efter sista dos, annars minst 3 neg i följd, högst ett per dag	Omplacering om möjligt. Åter efter neg prov (se kolumn till vänster)	Åter efter neg prov (se kolumn till vänster)	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	2–3 (1-7) dagar
<u>Yersinia</u>	Nej	Åter vid symtomfrihet	Åter vid symtomfrihet	Ja	Ja, <u>se smittskyddsblad</u>	2–7 (1-10) dagar

**Riskyrken*: Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar.

[Smittskyddsbladet "Hygienråd vid tarmsmitta"](#) delas ut till patienter med tarmsmitta.

-

Författare	Titel	Klinik
Smittskyddsenheten		Smittskydd/Vårdhygien

Datum	Version/beskrivning av förändring
2023-03-29	1.0 / Reviderad, godkänd