

Mpox – rutin för smittspårning

Smittspårning runt ett fall av mpox innebär att identifiera kontakter och ge information och förhållningsregler utifrån typ av kontakt som förelegat med indexpatienten.

Smittspårningen ska påbörjas snarast efter besked om positivt provsvar.

Har uppgiven kontakt, symtom som tyder på mpox ska en läkartid på Hud- och könsmottagning (eller dess motsvarighet) bokas till kontakten för provtagning och vidare handläggning.

Till högriskkontakter kan det även vara aktuellt med postexpositionsprofylax med vaccin i vissa fall, om vaccin finns tillgängligt. Post-expositionsprofylax kan ges vid behov helst inom fyra dygn från exposition. Vaccin finns på Infektionsmottagningen, MSE och administreras via Infektionsmottagningen, kontakta infektionsjour tfn 016-10 52 22.

[Rekommenderade målgrupper för vaccination/pre-expositionsprofylax med mpox-vaccin \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/rekommenderade-malgrupper-for-vaccination/pre-expositionsprofylax-med-mpox-vaccin)

Fördelning av smittspårning gällande indexpatienten

Ansvarig läkare på Hud-och könsmottagningen (eller Infektions-/Barnklinik) – ansvarar för indexpatient och att uppgivna hushållskontakter får information och förhållningsregler.

Smittskyddsenheten – ansvarar för smittspårning personal inom vård- och omsorg.

Enheten för smittspårning – ansvarar för smittspårning av sexuella kontakter efter remiss från ansvarig läkare. Kan vid behov rådgöra med ansvarig läkare samt Smittskyddsenheten.

Smittskyddsblad

Vid smittspårning av Mpox, utgå alltid från smittskyddsblad för Mpox. Där finns också patientinformation att tillgå.

[Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen \(slf.se\)](https://www.smlf.se/smittskyddsblad)

Författare	Titel	Klinik
Smittskyddsenheten		Smittskydd/Vårdhygien

Datum	Version/beskrivning av förändring
2024-06-10	1.0 / Reviderad, godkänd