

Rutin för kommunikation med kommunen vid cytostatikabehandling

Bakgrund

Nya nationella riktlinjer har tagits fram för klassificering av preparat och hantering av cytoutsöndringar i hemmet efter cytostatikabehandling. För att dessa skall kunna efterföljas av hemsjukvård/hemtjänst/särskilt boende (inkl. LSS och socialpsykiatri och boendestöd) behöver datum för planerade cytostatika behandlingar (av gula och röda preparat) kommuniceras.

Nationella riktlinjer


[handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf \(cancercentrum.se\)](https://cancercentrum.se/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf)

Sju dagar efter avslutad behandling skall riktlinjerna följas gällande hantering av utsöndringar i hemmet.

Rutin

I Basfakta i Regimbiblioteket kan man se om preparatet är **rött** eller **gult** genom att trycka på aktuellt preparatnamn och sedan läsa under Anvisning-Handhavande.

[Basfakta om läkemedel - RCC Kunskapsbanken \(cancercentrum.se\)](https://cancercentrum.se/basfakta-om-lakemedel-rcc-kunskapsbanken)



Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Spoldropp Glukos 50 mg/mL används, inkompatibelt med Natriumklorid.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys

Avdelning/mottagning som planerar cytostatika behandling med **rött** eller **gult** preparat

- Fråga patient om hen har hemsjukvård/hemtjänst/särskilt boende
- Om Ja skriv fristående meddelande i Prator till hemsjukvård/hemtjänst/särskilt boende samt vårdcentral om plan för cytostatikabehandling. Vilka dagar samt att riktlinjer gällande utsöndringar skall följas 7 dagar efter behandling för att säkerställa en god arbetsmiljö.
- Dokumentera tydligt i journalen att kommun är involverad i hantering av utsöndringar
- Vid ändringar av preparat/datum för behandling skriv fristående meddelande i Prator till hemsjukvård/hemtjänst/särskilt boende + vårdcentral gällande justeringarna
- Om patienten står på tabletter kontinuerligt alt med endast 7 dagars uppehåll skall utsöndringarna hanteras kontinuerligt i enlighet med de nationella riktlinjerna.

Vid **grönt** preparat

- Ingen åtgärd förutom om preparat skulle ändras till gult eller rött
- Vid ändring följ ovanstående punkter

Primärvård hemsjukvård/hemtjänst/särskilt boende

- När patient skrivs in i hemsjukvård/hemtjänst/särskilt boende tillfrågas patient om hen är under någon form av cytostatikabehandling samt vart för att säkerställa arbetsmiljöperspektivet.
- Hemsjukvård/hemtjänst/särskilt boende skriver meddelande i Prator till aktuell mottagning/avdelning om att patienten nu erhåller hjälp i hemmet av vårdpersonal
- Mottagning dokumenterar och informerar när behandling ges enligt tidigare del av rutinen